



Aquí, viviendo con **cáncer de ovario**. Aquí para los buenos momentos, los malos momentos y los espacios silenciosos. Aquí para usted. Aquí para mí. **Aquí.**

## Su guía para el tratamiento con **ELAHERE**

En un estudio clínico, la mediana de la supervivencia general fue de 16.5 meses para ELAHERE frente a 12.7 meses para la quimioterapia tradicional.


### ¿Qué es ELAHERE?

ELAHERE es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultas con cáncer de ovario positivo para receptores de folato alfa, cáncer de las trompas de Falopio o cáncer peritoneal primario que:

- no han respondido o ya no responden al tratamiento con quimioterapia a base de platino y
- han recibido entre 1 y 3 tipos previos de quimioterapia.

Su proveedor de atención médica realizará una prueba para asegurarse de que ELAHERE sea adecuado para usted.

Se desconoce si ELAHERE es seguro y eficaz en niños.



Retrato de la paciente.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ELAHERE?

**ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

**Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión. **Continúe leyendo información sobre problemas oculares en la [página 2](#).**

**Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el [RECUADRO DE ADVERTENCIAS](#), en todo el documento.**

**Consulte la [Información de prescripción completa](#), que incluye la [Guía del medicamento](#), y analícela con su médico.**

 **ÍNDICE**

Esta guía está diseñada para ayudarla a comprender qué esperar durante el tratamiento con ELAHERE, desde comenzar a apoyo brindado a lo largo del camino.

<u>Acerca de ELAHERE</u> .....	3
<u>Resultados</u> .....	6
<u>Posible efectos secundarios</u> .....	8
<u>Cuidado de sus ojos</u> .....	10
<u>Inicio del tratamiento con ELAHERE</u> .....	12
<u>Hablar con su médico</u> .....	14
<u>Servicios de apoyo de ELAHERE</u> .....	15
<u>Palabras clave</u> .....	17



No está destinado a pacientes pediátricos. Retrato de la paciente.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)**

- Su proveedor de atención médica le enviará a consultar a un profesional de atención ocular para que revise sus ojos antes de que comience el tratamiento con ELAHERE, durante el tratamiento con ELAHERE y según sea necesario para cualquier signo y síntoma de empeoramiento de problemas oculares.
- Su proveedor de atención médica le recetará gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes antes de iniciar tratamiento con ELAHERE y durante este. Debe usar las gotas oftálmicas según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
- No use lentes de contacto durante todo el tratamiento con ELAHERE, a menos que su proveedor de atención médica le indique que los use.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.**

**Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.**



#### ACERCA DE ELAHERE

## ¿Es ELAHERE adecuado para mí?

ELAHERE es la **primera terapia dirigida** desarrollada y aprobada para el **cáncer de ovario resistente al platino FRa+**.

Consulte a su médico sobre ELAHERE para ver si es adecuado para usted.



### Ha recibido entre 1 y 3 tipos previos de quimioterapia

ELAHERE es para personas que ya han probado la quimioterapia y pueden necesitar un cambio en su enfoque de tratamiento.



### Su cáncer de ovario es resistente al platino

El cáncer de ovario resistente al platino se produce cuando el cáncer reaparece o progresa después de recibir un tipo de quimioterapia que contiene platino.



### Su cáncer es positivo para un tipo de proteína llamada FRa

Si el cáncer es FRa+, usted puede ser elegible para el tratamiento dirigido con ELAHERE.

**Términos clave:** [cáncer de ovario](#); [FRa+](#).

FRa=receptor de folato alfa.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

#### ¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de recibir ELAHERE?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene problemas de visión u ojos.
- tiene entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.
- tiene problemas hepáticos.
- está embarazada o planifica quedar embarazada. ELAHERE puede causar daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con ELAHERE.


Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la [Información de prescripción completa](#), que incluye la [Guía del medicamento](#), y analícela con su médico.



ACERCA DE ELAHERE

## Explore una opción de tratamiento dirigido



### ¿Qué es FRα y por qué es importante?

El receptor de folato alfa, o **FRα**, es una **proteína** que a menudo se encuentra en personas con cáncer de ovario. Es posible que su médico lo haga referencia como un **biomarcador**.

Las pruebas de FRα pueden ayudar a su médico a determinar si ELAHERE es adecuado para usted.

### ¿Cómo se diseña ELAHERE para dirigirse a las células cancerosas y combatir las?

ELAHERE puede afectar las células cancerosas, así como ciertas células sanas del cuerpo, lo que puede causar efectos secundarios.

ELAHERE es un tipo de tratamiento denominado conjugado anticuerpo-fármaco (**antibody-drug conjugate, ADC**). Los ADC son diferentes de las quimioterapias tradicionales. Están diseñados para atacar al cáncer de manera específica.



ELAHERE se une al exterior de la célula



Después de unirse a FRα, ELAHERE ingresa en la célula



ELAHERE libera un fármaco potente dentro de la célula que destruye el cáncer



El fármaco que elimina el cáncer también puede afectar otras células cercanas que pueden o no ser cancerosas

Término clave: [biomarcadores](#).

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

#### Pacientes que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba para la detección del embarazo antes de iniciar el tratamiento con ELAHERE.
- Debe usar un método anticonceptivo (contraceptivo) eficaz durante el tratamiento y durante 7 meses después de su última dosis de ELAHERE.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ELAHERE pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de ELAHERE.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



Aquí para vivir en el momento. Aquí para reírnos juntos, incluso cuando duela. **Aquí** para ver cómo ELAHERE puede ayudarme a estar presente.

En un estudio clínico, la mediana de la supervivencia general fue de 16.5 meses para ELAHERE frente a 12.7 meses para la quimioterapia tradicional.



Retrato de la paciente.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que usa, incluidos los de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar ciertos otros medicamentos durante el tratamiento con ELAHERE puede causar efectos secundarios.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.



**RESULTADOS**

## ELAHERE puede ayudar a evitar que el cáncer avance

En un estudio clínico de 453 personas con cáncer de ovario resistente al platino FRa+, ELAHERE ayudó a prolongar el tiempo hasta la progresión de la enfermedad en comparación con la quimioterapia tradicional.

### Mediana de supervivencia sin progresión



## Algunas personas que usaron ELAHERE vivieron más tiempo

En el mismo estudio clínico, se demostró que ELAHERE ayuda a las personas a vivir más tiempo en comparación con la quimioterapia tradicional.

### Mediana de la supervivencia general



**Términos clave:** [mediana de supervivencia sin progresión](#); [mediana de supervivencia general](#); [quimioterapia tradicional](#).

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?

**ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.




RESULTADOS

## Algunas personas tuvieron una mejor respuesta con ELAHERE

El estudio también halló que más tumores de personas disminuyeron en al menos un 30 % o desaparecieron cuando se las trató con ELAHERE en comparación con cuando se las trató con quimioterapia tradicional. La disminución en el tamaño del tumor duró una mediana de 6.8 meses en aquellas tratadas con ELAHERE y 4.5 meses en aquellas tratadas con quimioterapia tradicional.

Respuesta global\*



frente a

El **5 %** de las personas tuvo una respuesta completa, lo que significa que **NO** tuvieron signos de cáncer en una ecografía de seguimiento.

El **37 %** de las personas alcanzó una respuesta parcial, lo que significa que sus tumores disminuyeron en al menos un 30 %.

**NINGUNA** de las personas que recibieron tratamiento con quimioterapia tuvieron una respuesta completa.

El **16 %** de las personas tuvo una respuesta parcial.

\*En el estudio clínico, 225 personas tratadas con ELAHERE y 224 personas tratadas con quimioterapia tradicional fueron elegibles para ser evaluadas para determinar la respuesta global.

Término clave: [respuesta general](#).

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- **Problemas pulmonares (neumonitis).** ELAHERE puede causar inflamación grave o potencialmente mortal de los pulmones que puede provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si los síntomas empeoran, incluidos dificultad para respirar, falta de aire, tos o dolor de pecho.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



POSIBLE EFECTOS SECUNDARIOS

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento con ELAHERE?

ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:



### Problemas oculares

**Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves.**

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.



### Problemas pulmonares (neumonitis)

**ELAHERE puede causar inflamación grave o potencialmente mortal de los pulmones que puede provocar la muerte.**

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si los síntomas empeoran, incluidos dificultad para respirar, falta de aire, tos o dolor de pecho.



### Neuropatía periférica

**Los problemas nerviosos llamados neuropatía periférica son frecuentes durante el tratamiento con ELAHERE y también pueden ser graves.**

Su proveedor de atención médica la monitoreará para detectar signos y síntomas de problemas nerviosos. Informe a su proveedor de atención médica si presenta entumecimiento, hormigueo, sensación de ardor o dolor en las manos, los pies o debilidad muscular nuevos o que empeoran.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



## POSIBLE EFECTOS SECUNDARIOS

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento con ELAHERE? (cont.)



#### Los efectos secundarios más frecuentes y los análisis de laboratorio anormales incluyen:

- Aumento de las enzimas hepáticas en la sangre
- Sensación de cansancio
- Visión borrosa
- Náuseas
- Diarrea
- Dolor en la zona del estómago (abdominal)
- Cambios en la córnea (parte del ojo)
- Neuropatía periférica
- Dolor muscular, óseo o articular
- Disminución de recuento de glóbulos rojos o blancos
- Disminución de plaquetas
- Disminución del nivel de magnesio en la sangre
- Sequedad en los ojos
- Estreñimiento
- Vómitos
- Disminución del nivel de albúmina en la sangre
- Disminución del apetito

**Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de ELAHERE, retrasar el tratamiento o suspender el tratamiento por completo si tiene ciertos efectos secundarios.**

Debido a los efectos secundarios en un estudio clínico, el 24 % de las personas informó eventos adversos graves, el 9 % de las personas interrumpió el tratamiento, el 54 % de las personas tuvo retrasos en la dosis y el 34 % de las personas redujo la dosis.

De los pacientes tratados con ELAHERE en un estudio clínico, el 1 % experimentó debilitamiento o caída del cabello.



**Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ELAHERE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.**

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



**CUIDADO DE SUS OJOS**

## ¿Cómo podría ELAHERE afectar mis ojos?

Las personas tratadas con ELAHERE pueden desarrollar efectos secundarios relacionados con los ojos, que son frecuentes y pueden ser graves. Estos pueden incluir visión borrosa, ojos secos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento ocular, cambios nuevos o empeoramiento de la visión, cambios temporales en la superficie del ojo o cataratas. **Informe a su médico si tiene antecedentes de problemas de visión o de los ojos, o si experimenta alguno de los problemas oculares mencionados anteriormente durante el tratamiento.**



Su médico le pedirá que vea a un oftalmólogo antes de su primera infusión y periódicamente durante todo el tratamiento.



Los efectos secundarios relacionados con los ojos se produjeron con mayor frecuencia entre la **segunda y la tercera infusión** de ELAHERE.



El **1% de las personas** del estudio interrumpió el tratamiento debido a problemas oculares.



### Cuidado de los ojos durante el tratamiento

Visite [elahere.com/eye-care](http://elahere.com/eye-care) para obtener más información sobre el manejo de los efectos secundarios relacionados con los ojos.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- **Neuropatía periférica.** Los problemas nerviosos llamados neuropatía periférica son frecuentes durante el tratamiento con ELAHERE y también pueden ser graves. Su proveedor de atención médica la monitoreará para detectar signos y síntomas de problemas nerviosos. Informe a su proveedor de atención médica si presenta entumecimiento, hormigueo, sensación de ardor o dolor en las manos, los pies o debilidad muscular nuevos o que empeoran.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.




### CUIDADO DE SUS OJOS

## ¿Cómo puedo cuidar mis ojos con gotas oftálmicas?

Su médico le recetará gotas oftálmicas **con corticoesteroides** y gotas oftálmicas lubricantes sin conservantes de venta libre para que las use según las indicaciones antes y durante el tratamiento con ELAHERE. Evite el uso de lentes de contacto durante todo el tratamiento, a menos que su médico le indique que los use.

### Gotas oftálmicas con corticoesteroides

#### Programa recomendado de gotas oftálmicas con corticoesteroides para cada ciclo de infusión de ELAHERE (cada 3 semanas)



### Gotas oftálmicas lubricantes



También se recomienda el uso de gotas oftálmicas lubricantes sin conservantes **al menos 4 veces al día y según sea necesario durante el tratamiento**. Espere al menos 10 minutos después de aplicarse las gotas oftálmicas con corticoesteroides antes de usar las gotas oftálmicas lubricantes.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Los efectos secundarios más frecuentes y los análisis de laboratorio anormales de ELAHERE incluyen:

- aumento de las enzimas hepáticas en la sangre
- sensación de cansancio
- visión borrosa
- náuseas
- diarrea
- dolor en la zona del estómago (abdominal)
- cambios en la córnea (parte del ojo)
- neuropatía periférica
- dolor muscular, óseo o articular
- disminución de recuento de glóbulos rojos o blancos
- disminución de plaquetas
- disminución del nivel de magnesio en la sangre
- sequedad en los ojos
- estreñimiento
- vómitos
- disminución del nivel de albúmina en la sangre
- disminución del apetito

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



## INICIO DEL TRATAMIENTO CON ELAHERE

## Pasos para ayudarla a iniciar el tratamiento

### Antes de iniciar el tratamiento

#### FR $\alpha$

Su médico analizará una muestra de tejido para confirmar que su cáncer es FR $\alpha$ + y ayudar a determinar si ELAHERE puede ser adecuado para usted.

Para ello, pueden usar tejido tumoral almacenado de una biopsia o cirugía anterior, o bien, tomar una nueva muestra.



Su médico también le pedirá que vea a un oftalmólogo antes de su primera infusión y periódicamente durante todo el tratamiento.

Esto puede ayudarla a controlar cualquier efecto secundario relacionado con los ojos.



El médico le recetará gotas oftálmicas con corticoesteroides y le aconsejará sobre el uso de gotas oftálmicas lubricantes antes de iniciar tratamiento con ELAHERE y durante este.

Debe usar gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes según las indicaciones de su médico.



#### ¿Necesita recordatorios para usar las gotas oftálmicas?

Hay varias aplicaciones móviles disponibles para ayudarla a usted y/o a su cuidador a recordar su cronograma de administración de gotas oftálmicas. Consúltelos en su tienda de aplicaciones preferida.

**Antes de cada dosis de ELAHERE recibirá medicamentos para ayudar a prevenir reacciones relacionadas con la infusión, náuseas y vómitos.**

- Algunos de estos medicamentos se pueden tomar por vía oral y algunos se le pueden administrar mediante infusión en una vena.
- Por lo general, estos medicamentos se administrarán el mismo día de la infusión. Sin embargo, el médico puede optar por dárselos el día antes de que comience a usar ELAHERE.

**Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que esté utilizando, incluidos medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar ciertos otros medicamentos junto con ELAHERE puede causar efectos secundarios.**

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de ELAHERE, retrasar el tratamiento o suspender el tratamiento por completo si tiene ciertos efectos secundarios.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ELAHERE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Se le recomienda informar los efectos secundarios de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.**

**Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.**



#### INICIO DEL TRATAMIENTO CON ELAHERE

## ¿Cómo recibiré ELAHERE?

**ELAHERE se administra mediante infusión (i.v. o puerto de acceso) cada 3 semanas**

### Horas típicas por infusión

Su médico decidirá cuántos tratamientos necesita.

#### Semana 1

**1.5 a 3 HORAS**

#### Semana 4

**1 a 2 HORAS**

#### Semana 7

**1 a 2 HORAS**

### La dosis de ELAHERE se determina según su peso.

Para lograr una dosificación precisa, el médico la pesará antes del tratamiento. Si tiene efectos secundarios con ELAHERE, el médico puede reducir su dosis, retrasar su dosis o interrumpir el tratamiento por completo.

i.v. = intravenoso.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

#### ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ELAHERE?

**ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

**Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.

- Su proveedor de atención médica le enviará a consultar a un profesional de atención ocular para que revise sus ojos antes de que comience el tratamiento con ELAHERE, durante el tratamiento con ELAHERE y según sea necesario para cualquier signo y síntoma de empeoramiento de problemas oculares.
- Su proveedor de atención médica le recetará gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes antes de iniciar tratamiento con ELAHERE y durante este. Debe usar las gotas oftálmicas según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
- No use lentes de contacto durante todo el tratamiento con ELAHERE, a menos que su proveedor de atención médica le indique que los use.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.**

**Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.**



#### HABLAR CON SU MÉDICO

## Aquí para iniciar una conversación sobre ELAHERE

Es importante hacer preguntas y comenzar una conversación con su médico sobre lo que sigue en su tratamiento. La lista de preguntas a continuación puede ayudar a guiar su conversación.

### ¿No está segura de cómo iniciar la conversación con su médico? Intente preguntar:

- ¿Qué es FRa y por qué es importante?
- ¿Me han realizado pruebas para detectar FRa?
  - ¿Cuáles fueron mis resultados y cómo afectan mi vía de tratamiento?
- ¿Qué es la resistencia al platino?
- Si la quimioterapia con platino deja de funcionar para mí, ¿cuáles son mis próximos pasos?
- ¿Cómo funciona ELAHERE de manera diferente a otros tratamientos?
- ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con ELAHERE?
- ¿Puede explicarme qué esperar si comienzo el tratamiento con ELAHERE?



### Cree su guía de debate

Visite [elahere.com/talking-to-your-doctor](http://elahere.com/talking-to-your-doctor) para personalizar una guía de análisis que puede ayudarla a iniciar una conversación con su médico.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

#### ¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de recibir ELAHERE?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene problemas de visión u ojos.
- tiene entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.
- tiene problemas hepáticos.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



#### SERVICIOS DE APOYO DE ELAHERE

## ELAHERE Support Services (ESS) está aquí para ayudarla a transitar el camino de su tratamiento.

Una vez inscrita, ESS puede ayudarla con preguntas sobre cobertura de seguro y brindarle apoyo de enfermería para sus preguntas relacionadas con ELAHERE. **Simplemente hable con su médico para presentar el formulario de inscripción en los Servicios de apoyo de ELAHERE.**

### Enfermeros de enlace ofrecidos a través de los Servicios de apoyo de ELAHERE

Los enfermeros capacitados están disponibles por teléfono para responder preguntas sobre la información aprobada por la FDA sobre ELAHERE, a la vez que ofrecen apoyo continuo a lo largo de su tratamiento.

### Gerentes de casos ofrecidos a través de los Servicios de apoyo de ELAHERE

Los Gerentes de casos ayudarán a responder sus preguntas sobre cobertura de seguro, copago o el Programa de asistencia al paciente (Patient Assistance Program, PAP).

### La asistencia financiera incluye las siguientes opciones:



#### Si tiene un seguro comercial\*:

Los pacientes elegibles para el Programa de asistencia con copagos ESS podrían pagar tan solo \$0 por su medicamento.



#### Si usted no tiene seguro o su seguro actual no proporciona suficiente cobertura o tratamiento:

El Programa de asistencia al paciente proporciona ELAHERE a los pacientes elegibles sin ningún costo.<sup>†</sup>

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- está embarazada o planifica quedar embarazada. ELAHERE puede causar daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con ELAHERE.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



“

Tengo tantos motivos para estar aquí y lo celebro todos los días”.

Heidi, una persona real, le recetó ELAHERE.



### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

#### Pacientes que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba para la detección del embarazo antes de iniciar el tratamiento con ELAHERE.
- Debe usar un método anticonceptivo (contraceptivo) eficaz durante el tratamiento y durante 7 meses después de su última dosis de ELAHERE.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ELAHERE pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de ELAHERE.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



#### PALABRAS CLAVE

## Términos clave para tener en cuenta a medida que aprende sobre ELAHERE

Los **biomarcadores** son genes, proteínas u otras sustancias que pueden analizarse, hallarse y medirse para darle a su médico más información sobre el cáncer, como si el tumor está creciendo o qué tan bien puede responder a ciertos tratamientos. ([página 4](#))

**FRa+ (positivo para el receptor de folato alfa)** es un resultado de análisis de biomarcadores que significa que usted tiene una determinada cantidad de FRa en la superficie de sus células cancerosas. ([página 3](#))

La **mediana de la supervivencia general** es el período durante el cual la mitad de las personas estaban vivas después de iniciar el tratamiento. ([página 6](#))

La **mediana de supervivencia sin progresión** es el período durante el cual el tratamiento detiene el crecimiento o el empeoramiento del cáncer en la mitad de las personas. Mediana significa el número medio en un grupo de números que se disponen de menor a mayor. ([página 6](#))

El **cáncer de ovario** se utiliza en esta guía para referirse al cáncer de ovario, cáncer de trompas de Falopio y cáncer peritoneal primario. ([página 3](#))

La **respuesta global** es una medida de todas las personas que tuvieron una respuesta completa o parcial. ([página 7](#))

La **quimioterapia tradicional** en el estudio clínico incluyó fármacos anticancerígenos que no son dirigidos y que no contienen un material denominado platino. ([página 6](#))

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

**Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que usa**, incluidos los de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar ciertos otros medicamentos durante el tratamiento con ELAHERE puede causar efectos secundarios.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.**

**Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.**



# Por todos los motivos que hay para que esté aquí, consulte a su médico sobre **ELAHERE**

En un estudio clínico, la mediana de la supervivencia general fue de 16.5 meses para ELAHERE frente a 12.7 meses para la quimioterapia tradicional.

Visite [elahere.com](http://elahere.com) para obtener más información.

## ¿Necesita apoyo o tiene preguntas?

Llame a 1-833-ELAHERE (1-833-352-4373)

de lunes a viernes de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del Este

o por correo electrónico a [ELAHERESupport@cardinalhealth.com](mailto:ELAHERESupport@cardinalhealth.com)

\*Elegibilidad: Disponible para los pacientes con cobertura de seguro comercial para **ELAHERE** que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Este programa de asistencia para copago no está disponible para los pacientes que reciben reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de un programa de seguro federal, estatal o financiado por el gobierno (por ejemplo, los programas Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos), o donde lo prohíba la ley. Oferta sujeta a cambio o finalización sin previo aviso. Pueden aplicarse restricciones, incluidas cantidades máximas mensuales. Este no es un seguro de salud. **Para conocer todos los Términos y condiciones, visite [elahere.com/copay-terms](http://elahere.com/copay-terms) o llame al 1-833-352-4373 para obtener información adicional. Para obtener información sobre las prácticas de privacidad de AbbVie y sus opciones de privacidad, visite <https://abbvie.com/corpprivacy>.**

† Los criterios incluyen: pacientes que no tienen seguro o tienen seguro que no incluye la cobertura de ELAHERE (incluidos pacientes que reciben Medicare o Medicaid), residentes de los Estados Unidos o Puerto Rico y pacientes que cumplen con los requisitos de elegibilidad financiera. Se aplican términos y condiciones.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?

**ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.**

**Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.**