



Aquí para gestionar la atención ocular

Utilice este recurso para ayudar a cuidar sus ojos mientras recibe tratamiento.

¿Qué es ELAHERE?

ELAHERE es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultas con cáncer de ovario positivo para receptores de folato alfa, cáncer de las trompas de Falopio o cáncer peritoneal primario que:

- no han respondido o ya no responden al tratamiento con quimioterapia a base de platino y
- han recibido entre 1 y 3 tipos previos de quimioterapia.

Su proveedor de atención médica realizará una prueba para asegurarse de que ELAHERE sea adecuado para usted.

Se desconoce si ELAHERE es seguro y eficaz en niños.



Retrato de la paciente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ELAHERE?

ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Problemas oculares. Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión. **Continúe leyendo información sobre problemas oculares en la [página 2](#).**

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la [Información de prescripción completa](#), que incluye la [Guía del medicamento](#), y analícela con su médico.

 ÍNDICE

Use este folleto para obtener más información sobre cómo ayudar a controlar cualquier efecto secundario relacionado con los ojos durante el tratamiento con ELAHERE.

Cómo comenzar el tratamiento 3

Control de los efectos secundarios relacionados con los ojos 5

Cuidado de sus ojos 7

Hablar con su médico sobre la atención ocular 9



Retrato de la paciente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- Su proveedor de atención médica le enviará a consultar a un profesional de atención ocular para que revise sus ojos antes de que comience el tratamiento con ELAHERE, durante el tratamiento con ELAHERE y según sea necesario para cualquier signo y síntoma de empeoramiento de problemas oculares.
- Su proveedor de atención médica le recetará gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes antes de iniciar tratamiento con ELAHERE y durante este. Debe usar las gotas oftálmicas según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
- No use lentes de contacto durante todo el tratamiento con ELAHERE, a menos que su proveedor de atención médica le indique que los use.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.



CÓMO COMENZAR EL TRATAMIENTO

¿Cómo podría ELAHERE afectar mis ojos?

Las personas tratadas con ELAHERE pueden desarrollar efectos secundarios relacionados con los ojos, que son frecuentes y pueden ser graves. Estos pueden incluir visión borrosa, ojos secos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento ocular, cambios nuevos o empeoramiento de la visión, cambios temporales en la superficie del ojo o cataratas. **Informe a su médico si tiene antecedentes de problemas de visión o de los ojos, o si experimenta alguno de los problemas oculares mencionados anteriormente durante el tratamiento.**



Los efectos secundarios relacionados con los ojos se produjeron con mayor frecuencia entre la **segunda y la tercera infusión** de ELAHERE.



El **1 % de las personas** del estudio interrumpió el tratamiento debido a problemas oculares.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de recibir ELAHERE?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene problemas de visión u ojos.
- tiene entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.
- tiene problemas hepáticos.
- está embarazada o planifica quedar embarazada. ELAHERE puede causar daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con ELAHERE.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



CÓMO COMENZAR EL TRATAMIENTO

Inicio del tratamiento con atención ocular

Antes de comenzar el tratamiento, informe a su médico y a su oftalmólogo sobre cualquier problema ocular que pueda tener. Su médico también le pedirá que vea a un oftalmólogo antes de su primera infusión y periódicamente durante todo el tratamiento.



Visitará a un oftalmólogo para un examen ocular inicial. Luego, se le realizarán exámenes oculares de seguimiento durante todo el tratamiento con ELAHERE, aproximadamente cada 6 semanas durante los primeros 8 ciclos de tratamiento.

Esto hará que su equipo de atención médica lleve un registro de cualquier posible cambio en su visión u ojos durante el tratamiento.



Su médico le recetará 2 tipos diferentes de gotas oftálmicas para usar antes y durante el tratamiento con ELAHERE:

- Gotas oftálmicas con corticoesteroides recetadas, surtidas por un farmacéutico
- Gotas lubricantes para los ojos sin conservantes, que se pueden comprar sin receta

Debe usar gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes según las indicaciones de su médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Pacientes que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba para la detección del embarazo antes de iniciar el tratamiento con ELAHERE.
- Debe usar un método anticonceptivo (contraceptivo) eficaz durante el tratamiento y durante 7 meses después de su última dosis de ELAHERE.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ELAHERE pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de ELAHERE.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.

Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.



CONTROL DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS RELACIONADOS CON LOS OJOS

¿Qué sucede si tengo efectos secundarios relacionados con los ojos?

Informe cualquier cambio o problema en los ojos a su oftalmólogo

Su oftalmólogo podrá ayudarlo a controlar los efectos secundarios.

Algunos efectos secundarios relacionados con los ojos pueden incluir:

- Visión borrosa
- Dolor en los ojos
- Deterioro visual
- Sequedad en los ojos
- Enrojecimiento de los ojos
- Cambios temporales en la superficie del ojo
- Sensibilidad a la luz
- Cataratas

Si experimenta efectos secundarios, sus médicos podrían hablar entre sí sobre los siguientes pasos, como:



Detener el tratamiento hasta que los síntomas mejoren. Una vez que los síntomas mejoren, puede **reanudar el** tratamiento.



Continuar el tratamiento con ELAHERE a una dosis **reducida**.



Interrumpir el tratamiento según la gravedad de los efectos secundarios relacionados con los ojos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que usa, incluidos los de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar ciertos otros medicamentos durante el tratamiento con ELAHERE puede causar efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?

ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.

Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.



“

Para controlar los efectos secundarios relacionados con ELAHERE, el médico podría cambiar su dosis o retrasar o suspender el tratamiento. En mi caso, mi médico pospuso algunos de mis tratamientos, lo cual ayudó. También visito a mi oftalmólogo con regularidad durante los ciclos de tratamiento”.

Heidi, una persona real, le recetó ELAHERE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- **Problemas pulmonares (neumonitis).** ELAHERE puede causar inflamación grave o potencialmente mortal de los pulmones que puede provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si los síntomas empeoran, incluidos dificultad para respirar, falta de aire, tos o dolor de pecho.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.




CUIDADO DE SUS OJOS

¿Cómo debo usar las gotas oftálmicas durante el tratamiento?

Su médico le recetará gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes sin conservantes de venta libre para que las use según las indicaciones antes y durante el tratamiento con ELAHERE. Evite el uso de lentes de contacto durante todo el tratamiento, a menos que su médico le indique que los use.

Gotas oftálmicas con corticoesteroides

Programa recomendado de gotas oftálmicas con corticoesteroides para cada ciclo de infusión de ELAHERE (cada 3 semanas)



Gotas oftálmicas lubricantes



También se recomienda el uso de gotas oftálmicas lubricantes sin conservantes **al menos 4 veces al día y según sea necesario durante el tratamiento**. Espere al menos 10 minutos después de aplicarse las gotas oftálmicas con corticoesteroides antes de usar las gotas oftálmicas lubricantes.



Descargue el Registro del colirio

Visite elahere.com/eye-drops para que le ayude a llevar un registro del uso de las gotas oftálmicas, registre notas para compartir con su médico y anote las fechas de las próximas citas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- **Neuropatía periférica.** Los problemas nerviosos llamados neuropatía periférica son frecuentes durante el tratamiento con ELAHERE y también pueden ser graves. Su proveedor de atención médica la monitoreará para detectar signos y síntomas de problemas nerviosos. Informe a su proveedor de atención médica si presenta entumecimiento, hormigueo, sensación de ardor o dolor en las manos, los pies o debilidad muscular nuevos o que empeoran.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



CUIDADO DE SUS OJOS

Consejos para manejar la visión borrosa

Deberá evitar usar lentes de contacto durante su tratamiento con ELAHERE, por lo que le puede resultar útil usar anteojos. Hable con su oftalmólogo sobre las opciones de anteojos.



En los días en los que su visión es borrosa, es posible que deba hacer que el texto sea más grande en sus dispositivos. Estas son algunas formas de hacerlo (los ejemplos específicos basados en su modelo telefónico pueden variar):

Computadora: ¿Sabía que puede aumentar el tamaño de la fuente en un sitio web que está viendo? Por ejemplo, si tiene un mouse con ruedita, en una PC puede mantener presionada la tecla Ctrl en el teclado y luego desplazar la rueda hacia arriba o hacia afuera para aumentar el tamaño del texto (desplácese hacia abajo o hacia abajo para reducir el tamaño del texto). Incluso sin un mouse, los comandos de teclado pueden hacer lo mismo. Busque en línea consejos específicos para su dispositivo.

iPhone: Vaya a Configuración, luego a Accesibilidad, y luego seleccione Tamaño de pantalla y texto. Toque Texto más grande para opciones de fuente más grandes. Arrastre el control deslizante hasta el tamaño que desee.

Android: Abra la aplicación Configuración de su dispositivo. Seleccione Accesibilidad, luego Tamaño y texto de la pantalla. Utilice el control deslizante para seleccionar el tamaño de fuente que desea.



¿Necesita recordatorios para usar las gotas oftálmicas?

Hay varias aplicaciones móviles disponibles para ayudarla a usted o a su cuidador a recordar su cronograma de administración de gotas oftálmicas. Consúltelos en su tienda de aplicaciones preferida.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Los efectos secundarios más frecuentes y los análisis de laboratorio anormales de ELAHERE incluyen:

- aumento de las enzimas hepáticas en la sangre
- sensación de cansancio
- visión borrosa
- náuseas
- diarrea
- dolor en la zona del estómago (abdominal)
- cambios en la córnea (parte del ojo)
- neuropatía periférica
- dolor muscular, óseo o articular
- disminución de recuento de glóbulos rojos o blancos
- disminución de plaquetas
- disminución del nivel de magnesio en la sangre
- sequedad en los ojos
- estreñimiento
- vómitos
- disminución del nivel de albúmina en la sangre
- disminución del apetito

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



HABLAR CON SU MÉDICO SOBRE LA ATENCIÓN OCULAR

Aquí para hablar sobre la atención ocular

Consulte a continuación algunas preguntas para comenzar la conversación con sus médicos:

- ☐ ¿Cuáles son los efectos secundarios relacionados con los ojos que pueden ocurrir con ELAHERE?
- ☐ ¿Hay alguna manera en que pueda manejar los efectos secundarios relacionados con los ojos durante el tratamiento?
- ☐ ¿Hay algo que deba hacer para cuidar de mis ojos?
- ☐ ¿Cuándo debo informarle si experimento algo nuevo o inusual con los ojos?
- ☐ ¿Con qué frecuencia debo realizarme un examen ocular?
- ☐ **Preguntas para su oftalmólogo:** Mi oncólogo me está tratando con un fármaco que puede afectar mis ojos. ¿Podría su consultorio trabajar con ellos para ayudar a monitorear mi salud ocular durante el tratamiento?



Visite [zocdoc.com](https://www.zocdoc.com) para encontrar un oftalmólogo cerca de su domicilio.

Este sitio web está desarrollado por Zocdoc. Esto no es un aval, derivación ni recomendación de ningún oftalmólogo o profesional médico por parte de AbbVie.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de ELAHERE, retrasar el tratamiento o suspender el tratamiento por completo si tiene ciertos efectos secundarios.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ELAHERE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Se le recomienda informar los efectos secundarios de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, en todo el documento.

Consulte la **Información de prescripción completa**, que incluye la **Guía del medicamento**, y analícela con su médico.



Consulte a su médico sobre el cuidado de los ojos con **ELAHERE**

Visite elahere.com/eye-care para obtener más información sobre la atención de los ojos durante todo su tratamiento.

¿Necesita apoyo o tiene preguntas?

Llame a 1-833-ELAHERE (1-833-352-4373)
de lunes a viernes de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del Este
o por correo electrónico a ELAHERESupport@cardinalhealth.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ELAHERE?

ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Problemas oculares. Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.

- Su proveedor de atención médica le enviará a consultar a un profesional de atención ocular para que revise sus ojos antes de que comience el tratamiento con ELAHERE, durante el tratamiento con ELAHERE y según sea necesario para cualquier signo y síntoma de empeoramiento de problemas oculares.
- Su proveedor de atención médica le recetará gotas oftálmicas con corticoesteroides y gotas oftálmicas lubricantes antes de iniciar tratamiento con ELAHERE y durante este. Debe usar las gotas oftálmicas según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
- No use lentes de contacto durante todo el tratamiento con ELAHERE, a menos que su proveedor de atención médica le indique que los use.

Consulte la Información importante de seguridad adicional, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, en todo el documento.

Consulte la Información de prescripción completa, que incluye la Guía del medicamento, y analícela con su médico.