

**GUÍA DEL MEDICAMENTO**  
**ELAHERE® (el-ah-HERE)**  
**(mirvetuximab soravtansine-gynx)**  
**injection, for intravenous use**

**¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ELAHERE?**

**ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

- **Problemas oculares.** Los problemas oculares son frecuentes con ELAHERE y también pueden ser graves. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla problemas oculares durante el tratamiento con ELAHERE, incluidos visión borrosa, sequedad en los ojos, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos o cambios nuevos o empeoramiento de la visión.
  - Su proveedor de atención médica le enviará a consultar a un profesional de atención ocular para que le controle los ojos antes de que comience el tratamiento con ELAHERE, durante el tratamiento con ELAHERE y según sea necesario para cualquier signo y síntoma de empeoramiento de problemas oculares.
  - Su proveedor de atención médica le recetará gotas oftálmicas con esteroides y gotas oftálmicas tópicas lubricantes antes de iniciar tratamiento con ELAHERE y durante este. Debe usar las gotas oftálmicas según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
  - No use lentes de contacto durante todo el tratamiento con ELAHERE, a menos que su proveedor de atención médica le indique que los use.

Consulte “**¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?**” para obtener más información sobre los efectos secundarios.

**¿Qué es ELAHERE?**

ELAHERE es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultas con cáncer de ovario positivo para receptores de folato alfa, cáncer de las trompas de Falopio o cáncer peritoneal primario que:

- no han respondido o ya no responden al tratamiento con quimioterapia a base de platino, y
- han recibido entre 1 y 3 tipos previos de quimioterapia.

Su proveedor de atención médica realizará una prueba para asegurarse de que ELAHERE sea adecuado para usted.

Se desconoce si ELAHERE es seguro y eficaz en niños.

**Antes de recibir ELAHERE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:**

- tiene problemas de visión u ojos;
- tiene entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies;
- tiene problemas hepáticos;
- está embarazada o planifica quedar embarazada. ELAHERE puede causar daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con ELAHERE.

**Pacientes que pueden quedar embarazadas:**

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba para la detección del embarazo antes de iniciar el tratamiento con ELAHERE.
- Debe usar un método anticonceptivo (contraceptivo) eficaz durante el tratamiento y durante 7 meses después de su última dosis de ELAHERE.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ELAHERE pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de ELAHERE.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome,** incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar ciertos otros medicamentos durante el tratamiento con ELAHERE puede causar efectos secundarios.

**¿Cómo recibiré ELAHERE?**

- Se le administrará ELAHERE mediante infusión en una vena (intravenosa o i.v.).
- Antes de cada dosis de ELAHERE recibirá medicamentos para ayudar a prevenir reacciones relacionadas con la infusión, náuseas y vómitos.
- ELAHERE generalmente se administra cada 3 semanas (ciclo de 21 días). El proveedor de atención médica decidirá cuántos ciclos necesita.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ELAHERE?

ELAHERE puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ELAHERE?”.
- **Problemas pulmonares (neumonitis).** ELAHERE puede causar inflamación grave o potencialmente mortal de los pulmones que puede provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si los síntomas empeoran, incluidos dificultad para respirar, falta de aire, tos o dolor de pecho.
- **Neuropatía periférica.** Los problemas nerviosos llamados neuropatía periférica son frecuentes durante el tratamiento con ELAHERE y también pueden ser graves. Su proveedor de atención médica la monitoreará para detectar signos y síntomas de problemas nerviosos. Informe a su proveedor de atención médica si presenta entumecimiento, hormigueo, sensación de ardor o dolor en las manos, los pies o debilidad muscular nuevos o que empeoran.

**Los efectos secundarios más frecuentes y los análisis de laboratorio anormales de ELAHERE incluyen:**

- aumento de las enzimas hepáticas en la sangre
- sensación de cansancio
- visión borrosa
- náuseas
- diarrea
- dolor en la zona del estómago (abdominal)
- cambios en la córnea (parte del ojo)
- neuropatía periférica
- dolor muscular, óseo o articular
- disminución del recuento de glóbulos rojos o blancos
- disminución de plaquetas
- disminución del nivel de magnesio en la sangre
- sequedad en los ojos
- estreñimiento
- vómitos
- disminución del nivel de albúmina en la sangre
- disminución del apetito

Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de ELAHERE, retrasar el tratamiento o suspender el tratamiento por completo si tiene ciertos efectos secundarios.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ELAHERE.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

### Información general sobre el uso seguro y eficaz de ELAHERE

A veces los medicamentos se recetan para otros fines que los que se mencionan en la Guía del medicamento. Si desea obtener más información sobre ELAHERE, consulte a su proveedor de atención médica. Puede pedirle a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico información sobre ELAHERE para profesionales de la salud.

### ¿Cuáles son los ingredientes de ELAHERE?

**Ingrediente activo:** mirvetuximab soravtansine-gynx

**Ingredientes inactivos:** ácido acético glacial, polisorbato 20, acetato de sodio, sacarosa y agua para inyección.

Fabricado por: AbbVie Inc., North Chicago, IL 60064 EE. UU.

Licencia de EE. UU. 1889

©2025 AbbVie Inc. Todos los derechos reservados.

ELAHERE y su diseño son marcas comerciales de ImmunoGen, Inc., una compañía de AbbVie.

Ref.: 752962-01

Para obtener más información, visite [www.elahere.com](http://www.elahere.com) o llame al 1-833-ELAHERE.

Esta Guía del medicamento fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Revisado 07/2025

LAB-13235 **VERSIÓN MAESTRA EN INGLÉS**

LAB-13295 **VERSIÓN MAESTRA EN ESPAÑOL**

abbvie